

CATALOGUS
PLANTARUM CUBENSIUM

EXHIBENS

COLLECTIONEM WRIGHTIANAM
ALIASQUE MINORES

EX INSULA CUBA MISSAS,

QUAS RECENSUIT

A. GRISEBACH,

PROFESSOR GOTTINGENSIS.

LIPSIAE

APUD GUILIELMUM ENGELMANN.

1866.

5. *ERYTHROXYLUM OBTUSUM* DC. (Lind.; Poepp.; Rug. 222; Wr. 86; *E. havanense* Kth., non Jacq.; *E. areolatum* Poepp., non L.)

6. *ERYTHROXYLUM HAVANENSE* Jacq. amer. pict. t. 130 (Wr. 2137: differt ab *E. ovato* Cav. foliis subcoriaceis laevigatis subtus rufescentibus, venis non prominulis supra inconspicuis subtus tenuissimis laxae areolatis, stipulis brevioribus ovatis acutis, floribus serotinis. E.

7. *ERYTHROXYLUM RUFUM* Cav. (Rug. 715).

8. *ERYTHROXYLUM „SQUAMATUM* V.“ ex synonym. *E. havanensis* Rich. (Rich.)

XL. MALPIGHIACEAE.

1. *BYRSONIMA „CINEREA* DC.“ (Rich.: ins. de Piños).

2. *BYRSONIMA CRASSIFOLIA* Kth. (Poepp.; Lind.; Wr.); var. *glabrata* (Wr. 2142); var. *lanceolata* DC. (Wr. cum a.)

3. *BYRSONIMA CHRYSOPHYLLA* Kth.; var. *lanceifolia* Gr. (Wr. 2145: forma foliis lanceolato-oblongis et calyce 10glanduloso; a *B. sericea* DC. var. *angustifolia* differt ovario glabro).

4. *BYRSONIMA PINETORUM* Wr. foliis lanceolato-linearibus acuminatis (2''—1½'' longis, 3''—2'' latis) breviter petiolatis supra glabris nitidis subtus rufo-tomentosis, racemo brevi: bracteis minutissimis aequalibus tomento rufo occultatis, calyce 10glanduloso, antherae loculis pilosis connectivum subaequantibus, ovario ad angulos striguloso glabrescente. — A *B. crassifolia* var. *lanceolata* foliis angustioribus in acumen sensim a medio attenuatis structuraque racemi differt. — Cuba occ. (Wr. 2144). E.

5. *BYRSONIMA CUBENSIS* Juss. (Otto pl. cub. 161; Wr. 2143: bracteis inaequalibus, media duplo lateralibus longiori a simili *B. crassifolia* glabrata differt). E.

6. *BYRSONIMA SPICATA* Rich. (Wr. 82).

7. *BYRSONIMA LUCIDA* Rich. (Wr. 1150).

8. *BYRSONIMA BIFLORA* Gr. pl. Wr. p. 167 (Wr. 84). E.

9. *BUNCHOSIA NITIDA* Rich. ex specim. bogot. Goudot. (Wr. 2149: ab affini *B. Lindeniana* Juss. differt foliis basi cuneatis, petalis multo majoribus).

10. *BUNCHOSIA MEDIA* DC. (Wr. 89; „87“, „88“).

11. *SPACHEA „PARVIFLORA* Juss.“ (A. Juss.) E.

12. *SPACHEA „OSSANA* Juss.“ (A. Juss.)

13. *MALPIGHIA GLABRA* L. (Wr. 90).

14. MALPIGHIA „PUNICIFOLIA L.“ (Wr. „85“).
15. MALPIGHIA URENS L. (Wr. „2147“: non habeo);
var. *lanceolata* Gr. Fl. p. 117 (Rug. 367).
16. MALPIGHIA OXYCOCCA Gr. Fl. 117 (Wr. 83, 1583,
2148).
17. MALPIGHIA ANGUSTIFOLIA L. var. *cubensis* Kth. (Rug.
849; Wr. 2146).
18. MALPIGHIA CNIDA Spr. (Wr. 100).
19. MALPIGHIA SETOSA Spr. (Wr. 99: drupa ovato-sub-
globosa, trisulcata; *M. polytricha* Juss.)
20. MALPIGHIA COCCIGERA L. (Greene pl. havan.; Wr.
2150); var. *ilicifolia* Wr. foliis undulato-spinosis, calyce 10-
glanduloso (Wr. 2151).
21. GALPHIMIA GLAUCA Cav. (Wr. 2159).
22. HENLEA ECHINATA Gr. pl. Amer. trop. p. 37 (Rug.
279; *Henleophytum* Karst.) E.
23. BRACHYPTERIS BOREALIS Juss. (Wr. 2157).
24. STIGMAPHYLLON PUBERUM Juss. (Lane pl. havan.)
25. STIGMAPHYLLON MICROPHYLLUM Gr. pl. Wr. p. 168
(Wr. 93). E.
26. STIGMAPHYLLON DIVERSIFOLIUM Juss. (Wr. 2153);
var. (Wr. 2152: forma *parvifolia*, samarae appendice dorsali
basilari brevi rotundata, quae in α . deltoideo-acuta; „flores
rosei“).
27. STIGMAPHYLLON PERIPLOCIFOLIUM Juss. (Lind.; Wr.
2154).
28. STIGMAPHYLLON SAGRAEANUM Juss., Rich. t. 28 (Otto;
Fraser; Lind. 1724; Rug. 157; Wr. 97: transiens in *S. retic-
ulatum* Juss.)
29. STIGMAPHYLLON LINEARE Wr. Baeopteris, caule ad-
presse puberulo glabrescente, foliis rigidis linearibus obtu-
siusculis ($3\frac{1}{2}''$ — $1\frac{1}{2}''$ longis, $1\frac{1}{2}'''$ — $1'''$ latis) utrinque
laevibus avenis glabris: glandulis sessilibus basi laminae sub-
acutae adproximatis, pedicellis prope basin articulatis, stigma-
tibus binis compresso-truncatis, tertio obtuso, samara ($6'''$
longa): pericarpio costato, ala lineari-oblonga acutiuscula
($1''$ — $1\frac{1}{2}'''$ lata) rectiuscula: margine superiori ad basin ap-
pendice subrotunda obtusa instructo. — Affinis *S. Sagraeana*
Juss., sed venae prominulae in foliis nullae. — Cuba or., pr.
Cayo del Rey (Wr. 2156). E.
30. STIGMAPHYLLON SERICEUM Wr. caule dense sericeo,
foliis lanceolatis oblongisque mucronato-obtusis v. apice atte-
nuato acutiusculis ($18'''$ — $8'''$ longis, $5'''$ — $3'''$ latis) supra

glabris laevibus subtus villis amissis glabrescentibus subaveniis: glandulis ad basin laminae sessilibus, pedicellis prope basin articulatis, stigmatibus binis compresso-truncatis, tertio unci-formi, samara (6''' longa): pericarpio venoso-reticulato, ala latiuscula oblonga (3''' lata) apice oblique truncato-rotundata: margine utroque rectiusculo, superiori ad basin appendice obtuse deltoidea instructo. — Affinis praecedenti. — Cuba or., pr. Rio Toro (Wr. 2155). E.

31. *BANISTERIA PAUCIFLORA* Kth., Gr. Fl. p. 118 (Rug. 848; Wr. 95, 1584, 2158). E.

32. *HETEROPTERIS LAURIFOLIA* JUSS. (Poepp.; Rug. 400; Wr. 92; *H. coerulea* Kth.)

33. *TRIOPTERIS RIGIDA* SW. (Greene; G. Don.; Lane; Rug. 399; Wr. 96; *T. havanensis* Kth.); var. *jamaicensis* L., non Sw. (Wr. 96 a.: forma foliis ovali-oblongis).

34. *TETRAPTERIS* „sp.“ As. Gr. in pl. Wr. p. 168 (Wr. „94“: non vidi).

XLI. SAPINDACEAE.

1. *CARDIOSPERMUM HALICACABUM* L. var. *molle* Kth. (Wr.: forma foliis et capsula pubescentibus); var.? „*ferrugineum* Rich.“ (Rich.: „simile *C. molli* Kth., sed capsula parvula, glabriuscula, glandula disci unica transversa subemarginata, folia ferrugineo-villosa“).

2. *SERJANIA PANICULATA* Kth. (Wr. 2162).

3. *SERJANIA LUCIDA* Schum. (Drumm.; Greene; Rug. 910; Wr. 109; *S. Ossana* DC.)

4. *SERJANIA LUPULINA* Schum. (Rug. 52); var. *angustifolia* Gr. (Wr. 2160: forma foliolis lanceolatis); var.? *parvula* Wr. (Wr. 2164: forma „*humilis*, 2—4pedalis“, foliolis breviter oblongo-lanceolatis 6'''—8''' longis, racemis paucifloris; „fiores albi, squamis luteo-maculatis“: samarae speciminibus adjectae alienae sunt originis, Thouiniae).

5. *SERJANIA DIVARICATA* Sw. (Wr. 1587).

6. *SERJANIA CRENATA* Gr. pl. Wr. p. 168 (Wr. 108 a.; „2160“). E.

7. *SERJANIA ALBOPUNCTATA* Wr. ramulis glabris angulatis, foliis ambitu triangularibus pellucido-punctatis et flexuoso-lineolatis glabris supra nitidis subtusque sparsim albopunctatis et in axilla venarum principalium barbatis bipinnatis: pinnis 3—2-, foliolis 2—1jugis, his ovatis acutiusculis supra medium lobato-serratis: serraturis utrinque 2—1: petiolo nudo